



KOMUNIKAT DLA JABŁONI

Nadal aktualny jest komunikat dotyczący zwalczania porzewiacza jabłoniowego. Należy prowadzić systematyczną lustrację sadów. Żerowanie porzewiacza prowadzi do ordzawienia skórki owoców zwłaszcza w okolicach zagłębienia kielichowego, ponadto może być przyczyną słabego wybarwienia się owoców. Pierwszym symptomem obecności szkodnika może być skręcanie, wyginanie (łódeczkowanie) się liści. Do zwalczania szkodnika można zastosować Envidor 240EC (raz w sezonie) w dawce 0,4L/ha oraz preparaty z grupy abamektyn. Polecane preparaty mają działanie kontaktowe, dlatego należy użyć m.in. 750 l wody /ha oraz zwilżacz.

W obecnym sezonie dodatkową trudnością w zwalczaniu porzewiaczy może być silny wzrost pędów jednorocznych spowodowany mniejszą ilością owoców. Największe skupiska szkodników znajdują się pomiędzy pąkami a pędem, wokół pąków śpiących.

Nadal aktualne jest zwalczanie mszyc. W przypadku obecności szkodników konieczne jest wykonanie zabiegów z wykorzystaniem preparatów Actara 25 WG (0,1kg/ha) lub Apacz 25 WG (0,1-0,15kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan 20 SP lub Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha) lub Pirimor 500 WG (0,4kg/ha).

Obecnie przeciwko parchowi należy stosować preparaty kontaktowe zawierające kaptan, tiuram. Do cieczy roboczej należy dodać zwilżacz.

Do zwalczania mączniaka można stosować środki zawierające wodorowęglan potasu w dawce 6-7kg/ha z dodatkiem preparatów siarkowych w dawce 2kg/ha naprzemiennie ze środkami o innym mechanizmie działania np. Nimrod 250 SC (0,7-0,9l/ha), lub Kendo 50 EW (0,4-0,5 l/ha).