System ochrony drzew pestkowych przed chorobami i szkodnikami

BIOCONT POLSKA

nabrzmiewanie pąków
BBCH 0-51

pąki kwiatowe odsłonięte
BBCH 54


pąki kwiatowe z płatkami
BBCH 59

pełnia kwitnienia
BBCH 65

rozwój zalążni po przekwitnięciu
BBCH 71

opadanie zawiązków
BBCH 75

początek wybarwiania owoców
BBCH 81

zaawansowane wybarwianie
BBCH 85

okres zbioru
BBCH 87

Choroba/ Szkodnik	Środek	Dawka	
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych (Monilioza)	Alginure	3-6 l/ha	zwykle 2-4 zabiegi, prewencyjnie przed deszczem + WETCIT (0,2 - 0,3%)
	VitiSan	6-8 kg/ha	zwykle 2-4 zabiegi, prewencyjnie przed deszczem + WETCIT (0,2 - 0,3%)
	miedź		zwykle 2-4 zabiegi, prewencyjnie przed deszczem
	Myco-Sin	6-10 l/ha	zwykle 2-4 zabiegi, prewencyjnie przed deszczem
Zasychanie liści czereśni	Alginure	3-5 l/ha	+ WETCIT (0,2 - 0,3%)
	VitiSan	5 kg/ha	
	miedź		
	Myco-Sin	6-10 kg/ha	
Kędzierzawość liści brzoskwini	miedź		
Dziurkowatość liści drzew pestkowych	VitiSan	6-8 kg/ha	+ WETCIT (0,2 - 0,3%)
	miedź		
Owocnice	*Quassia ammara*	3-4,5 kg/ha	1-2 aplikacje pod koniec kwitnienia
Mszyce	PREV-B2 lub WETCIT	0,3-0,4% 0,1-0,3%	zabiegi w czasie występowania szkodnika
Owocówka śliwkóweczka	pułapki feromonowe		aplikacja przed początkiem lotu
Zwójki liściowe	*Bacillus thuringiensis*		zabiegi w czasie występowania najmłodszych gąsienic + WETCIT (0,2 - 0,3 %)

WETCIT (0,2 - 0,3 %) - adiuwant, stosowany w połączeniu z innymi preparatami poprawia ich działanie