

System ochrony jabłoni przed chorobami



Choroba	Środek	Dawka	pęknięcie pąków BBCH 0 - 53	rmysie uszko BBCH 54	różowy pąk BBCH 59	pełnia kwitnienia BBCH 65	zawiązki wielkości orzecha BBCH 71	zawiązki wielkości orzecha włoskiego BBCH 74	dojrzewanie owoców BBCH 75	okres zbioru BBCH 87	
Parch	Alginure	3-5 l/ha	← prewencyjnie + WETCIT (0,2 - 0,3%) →								
	Miedź	max. 500 g	← prewencyjnie (max. 500 g/ha) →								
	Siarka		← prewencyjnie →								
	VitiSan	0,5%						← w okresie kietkowania sporów, interwencyjnie do 24h po infekcji + WETCIT (0,2 - 0,3%) →			
Mączniak prawdziwy	Siarka		← prewencyjnie →								
	PREV-B2/ WETCIT + VitiSan	0,3-0,4%/ 0,2-0,3% + 6-8kg/ha	← podczas występowania objawów chorobowych (PREV-B2 0,3-0,4% + VitiSan 0,5%) →				← podczas występowania objawów chorobowych (WETCIT 0,2-0,3% + VitiSan 0,5%) →				
Choroby przechowalnicze	Myco-Sin	5-8 kg/ha						← →			
	VitiSan	0,5%						← zabieg przed zbiorem, 3x co 7 - 10 dni + WETCIT (0,2 - 0,3%) →			
Zaraza ogniowa	MycoSin + siarka	8-10 kg/ha			← prewencyjnie →						
Choroby kory	Miedź		← →								

WETCIT (0,2 - 0,3 %) - adiuwant, stosowany w połączeniu z innymi preparatami poprawia ich działanie